



El Boletín Diario Oceanográfico, del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), reporta información relacionada a las temperaturas y anomalías del nivel de superficie del ambiente marino y lacustre

del Perú, en base a registros *in situ* y de percepción remota, con el propósito de monitorear las condiciones térmicas asociadas a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS.

### MONITOREO DIARIO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AMBIENTE MARINO DE PERU

El 26 de noviembre las Anomalías de Temperatura Superficial del Mar (ATSM) que predominaron en la región Niño 3.4, corresponden a condiciones cálidas. En la región Niño 1+2 hubo una parcial presencia de condiciones cálidas y neutras, con una menor presencia de anomalías negativas (Fig. 1).

Frente a Perú, las anomalías positivas tanto en el norte como en el sur frente a Ilo permanecieron sin mayores cambios. Las anomalías negativas cerca de la costa, se expandieron e intensificaron ligeramente. Lejos de la costa predominaron condiciones neutras (Fig. 2).

Dentro de la franja costera de aprox. 50 mn, en los últimos treinta días, predominaron parcialmente condiciones frías con presencia de condiciones neutras y de anomalías positivas (Fig. 3).




Figura 1. ATSM (°C) en el Pacífico central y regiones Niño 3.4 (rectángulo) y Niño 1+2 (cuadrado) (Fuente NOAA-AVHRR / IMARPE).




Figura 2. Distribución espacial de ATSM (°C) frente a Perú, cada tres días (Fuente NOAA-AVHRR / IMARPE).




Figura 3. Diagrama Hovmöller de ATSM (°C) dentro de las ~50 mn frente a Perú, durante el periodo del 2013 al presente.



Tabla 1. Promedios de temperaturas registradas por el IMARPE y anomalías respecto al patrón climatológico mensual, en el litoral costero.

2014-11-26		
Estación	TSM °C	ATSM °C
Tumbes	27.00	0.90
Paita	17.83	-0.17
San José	19.77	0.27
Chicama	15.90	-0.30
Huanchaco	16.87	0.67
Chimbote	18.87	-0.63
Huacho	15.20	-0.60
Callao	15.37	0.27
Pisco	20.97	0.87
Ilo	16.23	0.33
(* no reportado)		




Figura 4. Distribución espacial de TSM (°C), frente a Perú (NOAA-AVHRR / IMARPE)




Figura 5. Diagramas Hovmöller de TSM (°C) durante un año, en puntos de monitoreo de información satelital a distancias de a) 110, b) 77, c) 44, d) 11 millas náuticas (mn) de la costa (puntos azules) y, e) en estaciones costeras registrados por IMARPE (puntos rojos).

El 26 de noviembre, en puntos de monitoreo del litoral costero, el promedio diario de la TSM varió entre 15.20 y 27.00 °C registrados en Huacho y Tumbes respectivamente (Tab. 1). La distribución espacial de TSM frente a Perú, mostró valores ligeramente elevados a lo habitual en la zona sur. La aguas con 18 °C se mostraron replegadas en la zona norte y ligeramente expandidas frente a Pisco. Lejos de la costa en el norte y sur permanecieron

aguas con 20 °C, aproximándose a la costa central (Fig. 4). Los diagramas Hovmöller, durante los últimos treinta días muestran que en el litoral predominaron temperaturas bajas (excepto en algunas bahías) (Fig. 5-e), al igual que las bajas temperaturas en puntos cercanos a la costa (excepto en el sur) (Fig. 5-d), mientras que en puntos lejanos a la costa, la zona sur mostró temperaturas altas más o menos parecidas a las de la zona norte (Fig. 5 a-c).




Figura 6. Series diarias de ATSM (°C) durante el último trimestre en estaciones costeras del IMARPE.




Figura 7. Promedios de las ATSM (°C), basados en: a) Observaciones satelitales en puntos de monitoreo ubicados a distancias aprox. de 110, 77, 44 y 11 millas náuticas (mn) de la costa y, b) Registros *in situ* del litoral costero.

Las ATSM del 26 de noviembre monitoreados en puntos del litoral costero variaron entre  $-0.63$  y  $0.90$  °C, ocurridos en Chimbote y Pisco, mostrando anomalías que oscilaron entre positivas y negativas. Los puntos de monitoreo del litoral presentaron en promedio una anomalía positiva de  $0.16$  °C (Tab. 1 y Fig. 6).

Los promedios de ATSM para los últimos cinco días en cada uno de los puntos indicaron lo siguiente: (i) El monitoreo vía satélite

dentro de las 110 mn de la costa, en puntos cercanos a la costa mostró anomalías negativas que llegaron a  $-2.15$  °C frente a Chimbote, así mismo en la zona sur predominaron anomalías positivas, que llegaron a  $0.99$  °C frente a Ilo (Fig. 7a). (ii) Los registros *in situ* en el litoral costero, mostraron promedios de anomalías que oscilaron entre  $-0.51$  y  $1.23$  °C, que correspondieron a Chimbote y Tumbes respectivamente (Fig. 7b).



# MONITOREO DIARIO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AMBIENTE LACUSTRE DE PERU





Figura 8. Series diarias de Temperatura Superficial del Lago (TSL) durante el último año, en estaciones de Puno, Juli y Ramis, registrados por el IMARPE..

## SISTEMA OBSERVACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE AMBIENTES ACUATICOS

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), con el propósito de proveer conocimiento para el uso sostenible de los ecosistemas, tiene entre sus objetivos, monitorear las condiciones térmicas, asociado a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo ENOS en el ambiente marino y lacustre, a través de registros *in situ* y observaciones satelitales. *In situ* los laboratorios de IMARPE registran temperaturas a nivel de superficie en el litoral costero de Tumbes, Paita, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco e Ilo, y en las estaciones del

litoral del Lago Titicaca, ubicadas en Puno, Juli y Ramis. En base a información satelital se evalúan datos de TSM procedentes del AVHRR–OISST-NCDC-NOAA, en puntos ubicados dentro de las 110 mn de la costa (Fig. 5).

Los registros de temperaturas tienen una frecuencia diaria, los reportes muestran las condiciones térmicas del día a través de gráficos con información de un día, de los últimos cinco días y de periodos largos. Los resultados se difunden a través del portal web del IMARPE y vía correo electrónico.

Fecha de Monitoreo: 26 de noviembre del 2014  
 Elaboración & Edición: Daniel Quispe Ramos / IMARPE - DGIOCC - AFIOF.  
 Fuente de Datos: IMARPE (Laboratorios Costeros y Continental), / NOAA-NCDC  
 Referenciar como: Boletín Diario Oceanográfico [on line], Callao, Instituto del Mar del Perú. Vol.1(058). [citado dd-mm-yyyy]. Disponible en <http:// ...>

Sugerencias:  
 • Para mayor información, visitar el portal web del IMARPE (www.imarpe.gob.pe)  
 • Comentarios y observaciones a: danquisper@gmail.com, afiof\_tsm@imarpe.gob.pe