

Boletín Diario Oceanográfico

Vol. 2, No. 105

Miércoles, 15 de abril del 2015

El Boletín Diario Oceanográfico, del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), reporta información de temperatura del agua y sus anomalías en el mar peruano como en el lago Titicaca, en base a mediciones directas en la red de estaciones costeras y limnológicas

del IMARPE, así como en base a registros de percepción remota. El propósito es monitorear los efectos de la variabilidad climática y del ciclo El Niño-Oscilación del Sur en la temperatura superficial del mar.

MONITOREO DIARIO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR PERUANO

La temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial continúa incrementándose. Actualmente, los núcleos con anomalías superiores a +2°C han ampliado su cobertura.

En el sector costero del Pacífico sudoriental se mantiene el calentamiento frente a Colombia, Ecuador, en el sector oceánico frente a Perú y en el litoral al sur de 17°S. En áreas cercanas a la costa peruana, desde Talara hasta Atico, el enfriamiento observado se ha reducido en cobertura (Figuras 1 - 3).

De acuerdo al pronóstico de vientos del modelo GFS/NOAA, las temperaturas de frías a neutrales en el litoral peruano prevalecerían en los próximos días.

Las condiciones térmicas e información complementaria indican que el calentamiento reciente está asociado al arribo de la onda Kelvin, cuya llegada se había previsto para el mes de marzo según el Comunicado Oficial ENFEN N°02-2015.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico central y subtropical. Las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 en los sectores central y oriental del océano, respectivamente, están delimitadas con una línea delgada de color negro (Fuente: Datos de AVHRR/NOAA; procesado por IMARPE).




Figura 2. Anomalías promedio diarias de la temperatura superficial del agua (°C) en el mar peruano los días 02, 05, 08, 11 y 14 de abril (Fuente: Datos de AVHRR/NOAA; procesado por IMARPE).




Figura 3. Evolución latitudinal de las anomalías promedio diarias de la temperatura superficial del mar (°C) para la franja de ~50 mn adyacentes al litoral peruano (Fuente: Datos de AVHRR/NOAA; procesado por IMARPE).

Boletín Diario Oceanográfico




Figura 4. Distribución espacial de la temperatura superficial del mar (°C) peruano (Fuente: Datos de AVHRR/NOAA; procesado por IMARPE).

Tabla 1. Promedio diario de la temperatura superficial del mar (°C) y sus anomalías registradas el 14 de abril de 2015 en la red de estaciones costeras del IMARPE. Las anomalías se han calculado con respecto del promedio climatológico mensual de cada estación.

| Estación | TSM °C | ATSM °C |
|-----------|--------|---------|
| Tumbes | 28.97 | 1.47 |
| Paita | 21.43 | 1.13 |
| San José | 20.43 | -0.17 |
| Chicama | 18.80 | 0.80 |
| Huanchaco | 18.17 | 0.17 |
| Chimbote | 21.27 | 0.17 |
| Huacho | 17.50 | 0.20 |
| Callao | 18.20 | 1.00 |
| Pisco | 23.70 | 1.40 |
| Ilo | 17.43 | 0.73 |




Figura 5. Evolución latitudinal de la temperatura superficial del mar (°C) diaria para puntos seleccionados en el mar peruano ubicados a a) 110 mn, b) 77 mn, c) 44 mn, d) 11 mn y, e) en las estaciones costeras de IMARPE en el litoral peruano. La localización de los puntos en el océano y en el litoral peruano se aprecian en la figura (f) en la forma de círculos en colores amarillo y rojo, respectivamente. (Fuente: Datos de AVHRR/NOAA para (a-d) y datos de la red de estaciones costeras de IMARPE para (e); procesado por IMARPE).

La distribución espacial de la temperatura superficial del mar registra valores superiores a 24°C a distancias mayores de 100 mn frente a la zona centro-norte. En tanto que, en la zona costera, las aguas con temperaturas <22 °C se mostraron de Paíta a San Juan (Figura 4).

La temperatura superficial del mar en el litoral registró valores de 17.43 °C (Ilo) a 28.97 °C (Tumbes) (Tabla. 1). Respecto al día anterior la TSM declinó en Tumbes, Paíta, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote y Pisco, aumentando levemente en Huacho, Callao e Ilo.

Los diagramas Hovmöller (Figura 5) muestran la evolución latitudinal de la temperatura superficial del mar (°C) diaria para puntos seleccionados en el mar peruano ubicados a 110 mn y hasta el litoral y refleja el calentamiento del océano y su mayor extensión en los últimos días.

Boletín Diario Oceanográfico




Figura 6. Series temporales del promedio diario de las anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en la red de estaciones costeras de IMARPE durante el último trimestre.




Figura 7. Promedios cada 5 días de las anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) basados en: a) Observaciones satelitales en puntos de monitoreo ubicados a distancias aprox. de 110, 77, 44 y 11 mn de la costa y, b) Registros *in situ* en las estaciones costeras de IMARPE.

Las anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en las estaciones costeras del IMARPE variaron entre -0.17 °C (San José) y $+1.47$ °C (Tumbes). Las estaciones presentaron, en promedio, una anomalía positiva de 0.69 °C (Tabla 1, Figura 6). Los promedios de anomalías térmicas para los últimos cinco días en cada uno de los puntos de monitoreo (Figura 5f) indicaron condiciones de enfriamiento de Atico a Paíta a 11 mn de la costa; así-

mismo, las máximas anomalías positivas se presentaron a 110 mn de Pisco y Callao (Figura 7a). Los registros *in situ* en el litoral mostraron promedios de anomalías de temperatura que oscilaron entre -0.31 °C y $+1.70$ °C, que correspondieron a Huacho y Pisco, respectivamente (Figura 7b).

Boletín Diario Oceanográfico

MONITOREO DIARIO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA DEL LAGO TITICACA





Figura 8. Series diarias de la temperatura superficial del agua en la red de estaciones limnológicas de IMARPE: a) Puno, b) Juli y c) Ramis en el lago Titicaca durante el último año. En la Figura 8d se aprecia la ubicación de las estaciones limnológicas (puntos en color rojo).

SISTEMA OBSERVACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE AMBIENTES ACUÁTICOS

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), con el propósito de proveer conocimiento para el uso sostenible de los ecosistemas, tiene entre sus objetivos, monitorear las condiciones térmicas, asociado a los efectos de la variabilidad climática y del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en el ambiente marino y lacustre, a través de registros *in situ* y observaciones satelitales. *In situ* los laboratorios de IMARPE registran temperaturas a nivel de superficie en el litoral costero de Tumbes, Paíta, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco e Ilo, y

en las estaciones del Lago Titicaca, ubicadas en Puno, Juli y Ramis. En base a información satelital se evalúan datos de TSM procedentes del AVHRR-OISST-v2 de NCDC/NOAA, en puntos ubicados dentro de las 110 mn de la costa (Figura 5). Los registros de temperatura tienen una frecuencia diaria, los reportes muestran las condiciones térmicas del día a través de gráficos con información de un día, de los últimos cinco días y de periodos largos. Los resultados se difunden a través del portal web del IMARPE y mediante correo electrónico.

Fecha de monitoreo: 14 de abril, 2015
 Elaboración: Laboratorio de Hidrofísica Marina/Área Funcional de Investigaciones en Oceanografía Física/DGIOCC/IMARPE
 Fuente de Datos: Red de estaciones costeras y limnológicas del IMARPE, datos de AVHRR-OISSTv2 de NCDC/NOAA.
 Referenciar como: Boletín Diario Oceanográfico [on line], Callao, Instituto del Mar del Perú. Vol.2 (105), 15 de abril 2015 (http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=101780204000000000000000).

Apreciamos sus comentarios y sugerencias sobre este documento. Para solicitudes de suscripción comunicarse a:

☎ (01) 208-8650 (Anexo 828)
 (01) 208-8663

@ lhfm_productos@imarpe.gob.pe