

El Boletín Diario Oceanográfico, del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), reporta información de temperatura del agua y sus anomalías en el mar peruano como en el Lago Titicaca, en base a mediciones directas en la red de estaciones costeras y limnológicas

del IMARPE y a registros de percepción remota. El propósito es monitorear los efectos de la variabilidad de corto plazo en la temperatura superficial del mar.

MONITOREO DIARIO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR PERUANO

En la línea ecuatorial, núcleos con anomalías de $+2.5^{\circ}\text{C}$ se acentúan al oeste de 120°W . La región Niño 1+2 continúa presentando la disminución de áreas cálidas registradas el día anterior (Figura 1). La zona costera al norte de los 10°S , muestra tendencia hacia la normalización de las condiciones oceanográficas, asociados a la presencia de menores áreas con anomalías de $+1^{\circ}\text{C}$ a $+3^{\circ}\text{C}$. El escenario al sur de los 14°S observan mayores áreas de enfriamiento, con anomalías de -2°C en la zona adyacente a la costa y anomalías con valores neutros y -1°C en la zona oceánica (Figura 2).

Las anomalías promedio diarias de la temperatura superficial del mar ($^{\circ}\text{C}$) para la franja de ~ 50 millas náuticas (mn) adyacente a la costa, muestran al parecer el termino de las condiciones cálidas (Figura 3).




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar ($^{\circ}\text{C}$) en el océano Pacífico tropical. Las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 en los sectores central y oriental del océano, respectivamente, están delimitadas con una línea delgada de color negro. Datos de AVHRR/NOAA. Procesamiento: IMARPE.




Figura 2. Anomalías de la temperatura superficial del agua ($^{\circ}\text{C}$) en el mar peruano los días 16, 19, 22, 25 y 28 de mayo. Datos: AVHRR/NOAA. Procesamiento: IMARPE.




Figura 3. Evolución latitudinal de las anomalías promedio diarias de la temperatura superficial del mar ($^{\circ}\text{C}$) para la franja de ~ 50 mn adyacentes al litoral peruano. Datos: AVHRR/NOAA. Procesamiento: IMARPE.

Boletín Diario Oceanográfico




Figura 4. Distribución espacial de la temperatura superficial del mar (°C) peruano. Datos: AVHRR/NOAA. Procesamiento: IMARPE.

Tabla 1. Promedio diario de la temperatura superficial del mar (°C) y sus anomalías registradas el 28 de mayo de 2015 en la red de estaciones costeras del IMARPE. Las anomalías se han calculado con respecto del promedio climatológico mensual de cada estación.

| Estación | TSM °C | ATSM °C |
|-----------|--------|---------|
| Tumbes | 29.07 | 2.07 |
| Paíta | 22.43 | 3.33 |
| San José | 22.33 | 2.53 |
| Chicama | 21.13 | 3.63 |
| Huanchaco | 22.47 | 4.97 |
| Chimbote | 22.87 | 2.97 |
| Huacho | 20.10 | 3.40 |
| Callao | 19.90 | 3.30 |
| Pisco | 21.00 | -0.10 |
| Ilo | 16.90 | 0.60 |




Figura 5. Evolución latitudinal de la temperatura superficial del mar (°C) diaria para puntos seleccionados en el mar peruano ubicados: a) 110 mn, b) 77 mn, c) 44 mn, d) 11 mn y, e) en las estaciones costeras de IMARPE en el litoral peruano. La localización de los puntos en el océano y en el litoral peruano se aprecian en la figura (f) en la forma de círculos en colores amarillo y rojo, respectivamente. Datos: AVHRR/NOAA para (a-d) y de la red de estaciones costeras de IMARPE para (e). Procesamiento: IMARPE.

Las condiciones a lo largo del litoral, mantienen características similares al 27.05.2015. En la zona costera entre los 7°S y 10°S se observa temperaturas de 22°C al borde de la costa. Al sur de los 14°S temperaturas menores de 19°C prevalecen en la zona costera con un leve incremento en su área de cobertura (Figura 4).

La temperatura superficial del mar en la red de estaciones costeras de IMARPE registró valores entre 17.27 °C (Ilo) y 28.60 °C (Tumbes). La estación de Huanchaco registró el máximo valor de anomalía (+5.00°C), seguida de las estaciones de Chimbote y Callao (+3.47°C). Pisco reportó la menor anomalía de -0.90°C (Tabla. 1).

La Figura 5 muestra la evolución latitudinal de la temperatura superficial del mar diaria para puntos seleccionados en el mar peruano ubicados a 110 mn y hasta el litoral

Boletín Diario Oceanográfico




Figura 6. Series temporales del promedio diario de las anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en la red de estaciones costeras de IMARPE durante el último trimestre. Datos y procesamiento: IMARPE.




Figura 7. Promedios cada 5 días de las anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) basados en: a) Observaciones satelitales en puntos de monitoreo ubicados a distancias aprox. de 110, 77, 44 y 11 mn de la costa y, b) Registros *in situ* en las estaciones costeras de IMARPE. Datos: AVHRR/NOAA para (a) y de la red de estaciones costeras de IMARPE para (b). Procesamiento: IMARPE.

Las anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en las estaciones costeras del IMARPE variaron entre -0.10 °C (Pisco) y +4.97 °C (Huanchaco). Las estaciones presentaron, en promedio, una anomalía positiva de +2.67 °C (Tabla 1, Figura 6).

Los promedios de ATSM para los últimos cinco días en cada uno de los puntos de monitoreo (Figura 5f) indicaron que a 11 mn de

Pisco, Atico e Ilo presentaron temperaturas levemente por debajo del promedio, en tanto que, las máximas anomalías positivas se presentaron a 44 mn de Chimbote (Figura 7a). En la costa, las anomalías promedio de temperatura del agua de mar para los últimos cinco días variaron de -0.41 °C (Pisco) a +4.87 °C (Huanchaco) (Figura 7b).

MONITOREO DIARIO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA DEL LAGO TITICACA




Figura 8. Series diarias de la temperatura superficial del agua en la red de estaciones limnológicas de IMARPE: a) Puno, b) Juli y c) Ramis en el lago Titicaca durante el último año. En la Figura 8d se aprecia la ubicación de las estaciones limnológicas (puntos en color rojo).

La temperatura superficial del agua en las estaciones de Ramis, y Puno, a orillas del lago Titicaca, presentaron promedios de 15.03 °C y 14.00 °C, respectivamente (Figura 8).

SISTEMA OBSERVACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), con el propósito de proveer conocimiento para el uso sostenible del mar peruano y el Lago Titicaca, monitorea las condiciones térmicas para conocer los impactos de la variabilidad climática y del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Para ello, se dispone de un sistema observacional a lo largo de la costa peruana como a orillas del Lago Titicaca donde se registran datos *in situ* de la temperatura superficial, además de otras variables. Estas observaciones se complementan con información

satelital de temperatura superficial del mar procedente de AVHRR-OISST-v2 de NCDC/NOAA.

Los registros de temperatura tienen una frecuencia diaria, los reportes muestran las condiciones térmicas en frecuencias temporales diarias, pentadales, mensuales.

Los resultados se difunden a través del portal web del IMARPE así como a una lista dedicada de usuarios mediante correo electrónico.

Fecha de monitoreo:

28 de mayo, 2015.

Elaboración:

Laboratorio de Hidrofísica Marina/Área Funcional de Investigaciones en Oceanografía Física/DGIOCC/IMARPE.

Fuente de Datos:

Red de estaciones costeras y limnológicas del IMARPE, datos de AVHRR-OISSTv2 de NCDC/NOAA.

Referenciar como:

Boletín Diario Oceanográfico [on line], Callao, Instituto del Mar del Perú. Vol.2 (149). [citado 29 de mayo 2015]. Disponible en <http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0178020400000000000000>.

Apreciamos sus comentarios y sugerencias sobre este documento. Para solicitudes de suscripción comunicarse a:

(01) 208-8650 (Anexo 828)
(01) 208-8663

lhfm_productos@imarpe.gob.pe